

บทบาทของแบคทีเรียแลคติกต่อ ชีวิตประจำวันของมนุษย์

อรณัฐ สุทธิกุลม

* อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ภาคใต้

แบคทีเรียแลคติกคือแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกออกมาภายหลังการใช้น้ำตาลเป็นอาหาร สามารถแบ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้ 2 ชนิดตามปริมาณของกรดแลคติกที่ผลิตออกมา (Tittsler และคณะ, 1952) ดังนี้

1. Homofermentative เป็นกลุ่มที่ใช้น้ำตาลกลูโคสแล้วผลิตกรดแลคติกออกมาเพียงอย่างเดียว 90% อีก 10% คือแก๊ส CO_2 ได้แก่เชื้อใน genus *Streptococcus*, *Pediococcus* และบาง species ของ genus *Lactobacillus*
2. Heterofermentative เป็นกลุ่มที่ใช้น้ำตาลกลูโคสแล้วผลิตกรดแลคติกออกมา 50% กรดอะซิติก และเอธิลแอลกอฮอล์ 25% และอีก 25% จะเป็นแก๊ส CO_2 ได้แก่เชื้อใน genus *Leuconostoc* และบาง species ของ *Lactobacillus*

แบคทีเรียแลคติกเป็นจุลินทรีย์ที่เลี้ยงยากตายง่าย ดังนั้นจึงต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีพมากกว่าจุลินทรีย์ทั่วไป เช่นต้องการสารอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด (Prescott และ Dunn, 1959) เนื่องจากเชื้อกลุ่มนี้ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญของเซลล์ได้ ไม่ผลิตเอ็นไซม์แคตาเลส ต้องการ O_2 เพียงเล็กน้อย (microaerophile) ในการเจริญ สามารถพบเชื้อที่แพร่กระจายทั่วไปตามธรรมชาติโดยอาจพบได้ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในดิน น้ำ พืช ผลิตภัณฑ์นม อาหาร หมักดองต่าง ๆ เป็นต้น (นภา, 2522)

แบคทีเรียแลคติกเป็นเชื้อที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ในปัจจุบันจึงได้มีผู้ศึกษาจุลินทรีย์กลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าเป็นเชื้อที่มีทั้งประโยชน์นานัปการ และบางชนิดเป็นจุลินทรีย์ที่มีโทษมหาศาลเช่นกัน

ประโยชน์ของแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้แก่การมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดอาหารหมักหลายชนิดที่รู้จักกันดี เช่น ผักดองเปรี้ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองของคนไทย คนจีน หรือ sauerkraut (กะหล่ำปลีดองของคนเยอรมัน) ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวต่าง ๆ เช่น ยาคูลท์ผลิตโดยเชื้อ *Lactobacillus* หรือโยเกิร์ตซึ่งผลิตโดยเชื้อผสม ของ *S. thermophilus* และ *L. bulgaricus* สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทเนื้อที่คนไทยรู้จักกันดีคือ แหนมและส้มผัก (ผลิตภัณฑ์ปลาหมักพื้นเมืองของคนลพบุรี) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากจุลินทรีย์ในสกุล *Pediococcus* และ *Lactobacillus* เป็นตัวการทำให้เกิดรสเปรี้ยวจากการใช้น้ำตาลที่มีในเนื้อสัตว์ และที่เดิมลงไปตามความจำเป็นในการผลิต (สมบุญ, 2518) นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้รายงานผลการทดลองว่า แบคทีเรียกลุ่มที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์อื่น ๆ เช่น *Bacillus subtilis*, *Micrococcus pyogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus aureus* เป็นต้น (Gilliland และ Speck, Bielecke และคณะ 1983 Mehta และคณะ 1984, 1977)

การยับยั้งเชื้ออื่นโดยแบคทีเรียแลคติกเกิดจากเชื้อสร้างสารบางชนิดออกมา ซึ่งกลไกการยับยั้งที่แท้จริงยังสรุปไม่ได้แน่นอน ทั้งที่อาจเป็นการยับยั้งโดยสารใดสารหนึ่งเพียงชนิดเดียวหรือเกิดผลร่วมของสารหลายชนิด (Dahiya และ Speck, 1968; Branen และคณะ, 1975; Gilliland และ Speck 1975) สารที่แบคทีเรียแลคติกผลิตออกมายับยั้งจุลินทรีย์อื่นได้แก่

1. สารปฏิชีวนะ เช่น nisin และ diplococcin ซึ่งผลิตโดย แบคทีเรียแลคติกสกุล *Streptococcus* (Hersch, 1951) สารปฏิชีวนะที่ผลิตโดย *L.acidophilus* (Hamdeen และ Mikolajcik, 1975) สาร lactolin ซึ่งผลิตโดย *L.plantarum* สาร bulgarican ที่ผลิตโดย *L.bulgaricus* (Reddy และ Shahani, 1971) เป็นต้น
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารที่ไม่ทนความร้อนอื่น ๆ (Gilliland และ Speck 1975)
3. กรดแลคติกและกรดระเหยบางชนิด เช่น กรดอะซิติก (Sorrel และ Speck 1970)
4. สารประเภทโปรตีนซึ่งทนอุณหภูมิสูงได้ดี (Kim, 1985)

เนื่องจากการทำอาหารหมักโดยวิธีธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จึงเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก ดังนั้นในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นนำเอาเชื้อบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการหมักอาหารแต่ละประเภทอย่างรวดเร็วมาใช้ผลิตหมักอาหารหมักในทางการค้ากันมากขึ้น ซึ่งจะเรียกเชื้อบริสุทธิ์ที่ใช้เติมลงไปก่อนการหมักอาหารว่า กล้าเชื้อ (starter culture) กล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติกจึงถูกนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดด้วยเช่นกัน เช่น เชื้อ *P.cerevisiae* ถูกนำมาใช้ในการหมักไส้กรอก (Gilliland, 1985) Smith และ Palumbo (1983) ได้ให้คำจำกัดความของคำ 'meat starter culture' ว่าหมายถึง จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตซึ่งนำไปใส่ในเนื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพการหมักให้ดีขึ้นและทำให้อาหารหมักที่ได้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค (Gilliland, 1985) ได้รวบรวมคุณสมบัติของกล้าเชื้อที่ดีว่าควรเป็นเชื้อที่เจริญในอุณหภูมิระหว่าง 26.7-43 องศาเซลเซียส มีความสามารถทนเกลือไนโตรที่เข้มข้น 80-100 ppm. และเจริญได้ดีในที่มีเกลือแอส 6 เปอร์เซ็นต์ ต้องไม่เป็นเชื้อโรคหรือเป็นเชื้อที่ไม่สร้างสารพิษใด ๆ เป็นเชื้อที่ไม่สร้างกลิ่นเน่าเหม็นให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ไม่สร้างเอ็นไซม์ proteolytic และ lipolytic ในกรณีที่แบคทีเรียแลคติกจะต้องเป็นเชื้อชนิด homofermentative ซึ่งจะผลิตกรดแลคติกเป็นส่วนใหญ่จากการใช้น้ำตาลกลูโคส เนื่องจาก heterofermentative สามารถใช้น้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 ตัวแล้วผลิตสารอื่น ๆ รวมทั้งแก๊ส CO₂ ซึ่งแก๊สที่จะไปทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารหมักเกิดการระเบิดและมีกลิ่นรสเปลี่ยนไปจากเดิม

สำหรับประเทศไทยมีอาหารหมักพื้นเมืองประเภทเนื้อหลายชนิด ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติกลดระยะเวลาในการหมักให้เร็วขึ้นกว่าการหมักโดยวิธีการตามธรรมชาติ เช่น จินดาร์ตัน (2522) ได้ใช้เชื้อบริสุทธิ์ *P.halophilus* หมักโตปลาโดยพบวาระดับพีเอชและเปอร์เซ็นต์กรดในระยะเวลาหมัก 6-8 วัน ใกล้เคียงกับโตปลาซึ่งหมักโดยวิธีธรรมชาติเป็นเวลา 12-13 วัน นอกจากนี้สุภาพ (2522) ได้ใช้เชื้อ *P.halophilus* ในการหมัก กุ้งจ่อมและหอยแมลงภู่ทอง ซึ่งพบว่าแบคทีเรียแลคติกทำให้ระยะเวลาในการหมักอาหารทั้ง 2 ชนิดลดลง และได้อาหารหมักที่มีกลิ่นรสคล้ายคลึงกับการหมักโดยวิธีธรรมชาติ

นอกจากจะใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติกลดระยะเวลาการหมักอาหารแล้วปัจจุบันชาวอเมริกันยังนิยมใช้กล้าเชื้อที่ทำจากแบคทีเรียแลคติกหรือ จุลินทรีย์อื่น ๆ (ดังแสดงในตารางที่ 1) ในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสดซึ่งเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็นให้นานขึ้น เชื้อที่นิยมใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาได้แก่ *P.acidilactici* และ *P.pentosaccus* (Smith และ Palumbo, 1983) การใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติกนี้ยังมีประโยชน์ต่ออาหารหมักที่ได้คือ ทำให้ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ เช่น ฮิสตามีน (histamine) (Rice และคณะ, 1975) ไนโตรซามีน (nitrosamine) และ โบ툴ินัม (botulinum) (Tanaka และคณะ, 1980) เป็นต้น

ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์เนื้อสด และผลิตภัณฑ์เนื้อหมักซึ่งใส่กลูตาเมตที่เรีย รา และยีสต์บางชนิด

จุลินทรีย์	ผลิตภัณฑ์
1. Bacteria	
1.1 <i>Pediococcus cerevisiae</i>	A.Semi-dry fermented sausage a. summer sausage b. cervelat c. Thuringer d. pork roll e. summer- style turkey sausage B. Dry fermented sausages a. dry sausage b. dry turkey sausage c. salami d. pepperoni e. hot bar sausage C. Processed meat a. country-style ham
1.2 <i>Pediococcus pentosaceus</i>	A. Semi-dry fermented sausage a. summer sausage B.Dry fermented sausages a. pepperoni b. Genoa
1.3 <i>Lactobacillus plantarum</i>	A. Semi-dry fermented sausage a. summer sausage B. Dry-fermented sausages a. salami b. European-type dry sausage C.Processed meat a. bacon b. country-style ham
1.4 <i>Lactobacillus brevis</i>	A. Fresh meat a. minced meat

1.5 Mixture of *P.cerevisiae*
and *L.plantarum*

A. Semi-dry fermented sausages

- a. Lebanon bologna
- b. summer sausage
- c. cervelat

B. Dry fermented sausages

- a. pepperoni
- b. dry turkey sausage

C. Processed meat

- a. cooked,mechanically deboned poultry meat

D. Fresh meat

- a. mechanically deboned poultry meat
- b. ground poultry breast meat

1.6 Mixture of *P. cerevisiae*
and *Micrococcus varians*

A. Dry fermented sausage

- a. Genoa
- b. dry sausage

2. Fungi and yeast

2.1 Individual *Penicillium*
species : *P. janthinellum*,
p. simplicissimum,*P.-*
-cyclopium or *P.*
viridicatum

A. Dry fermented sausage

- a. mold-ripened salami sausage

2.2 *Thamnidium elegans*

B. Fresh meat

- a. beef carcass aging

2.3 *Candida lipolytica*

A. Fresh fish

- a. fish

ที่มา Smith และ Palumbo (1983)

อย่างไรก็ตามแบคทีเรียแลคติกหลายชนิดด้วยกันที่ก่อโทษอย่างมหันต์ให้กับมนุษย์ เช่น *L.viridescens* สามารถผลิต H_2O_2 และ H_2S ออกมาทำให้อาหารประเภทไส้กรอกมีสีสรรเปลี่ยนแปลงจากเดิมสีแดงกลายเป็นสีเขียวซึ่งทำให้ดูไม่น่ารับประทาน (Frazier และ Westhof,1979) เชื้อ *S.agalactiae* เป็นแบคทีเรียแลคติกที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม เชื้อ *S.pyogenes* เป็นสาเหตุของโรคคอเจ็บ ไข้ดำแดง และฝี ซึ่งสามารถพบเชื้อชนิดนี้ได้ทั่วไปในน้ำนมดิบ นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อ *Leuconostoc mesenteroides* หรือ *L.dextranicum* ยังทำให้เกิดเมือก

ในน้ำอ้อยซึ่งเป็นสาร dextran มีผลทำให้ความหวานของน้ำอ้อย(ที่จะนำไปผลิตน้ำตาลทราย) ลดลง อีกทั้งสารเมือกที่จะไปทำให้ท่อและปั๊มต่าง ๆ ในเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเกิดการอุดตันเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

- จินดารัตน์ นิตวัฒนพงษ์. 2522. การศึกษาจุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นเมือง ไตปลา และปลาแปงแดง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 130 น.
- นภา โล่ห์ทอง. 2522. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (โรเนียว)
- สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2518. การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวการในระหว่างการทำแหมม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 120 น.
- สุภาพ อัจฉริยพงศ์. 2522. การศึกษาจุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นเมือง: กุ้งจ่อม และหอยแมลงภู่ดอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 125 น.
- Bielecka, M., A. Ruskiewicz and K.Melan.1983. Effect of cultivation conditions upon antagonistic activity of *Lactobacillus* against *Staphylococcus*, *Escherichia* and *Pseudomonas*. Dairy Sci. Abstr. 45 (6):404
- Branen, A.L., H.C. Go and R.P. Genske. 1975. Purification and properties of antimicrobial substances produced by *Streptococcus diacetylactis* and *Leuconostoc citrovorum*. J. Food. Sci. 40:446-450
- Dahiya, R.S. and M.L. Speck. 1968. Hydrogen peroxide formation by lactobacilli and its effect on *Staphylococcus aureus*. J.Dairy sci. 51: 11568-1572.
- Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. 1979. Food Microbiology. 3d ed., Tata McGraw-Hill Publ. Co., Ltd., New-Delhi. 540 pp.
- Gilliland, S.E. and M.L. Speck. 1975. Inhibition of psychrotrophic bacteria by *Lactobacilli* and *Pediococci* in non-fermented foods. J.food Sci. 40: 903-905.
1977. Antagonistic action of *Lactobacillus acidophilus* toward intestinal and food-borne pathogenic in associative culturess. J. Food Prot. 40:820-823

-
- Hamden, T.Y. and E.M. Mikolajcik. 19975. Acidophilin: antibiotic produced by *Lactobacillus acidophilus*. J. Antibiot. 27(86):631-636
- Hirsch, A. 1951. Growth and nisin production of a strain of *Streptococers lactis*. J. Gen. Microbial. 5: 208-221.
- Kim, D.S. 1985. Studies on the antimicrobial agent produced by *Lactobacillus acidophilus*. Dairy Sci. Abstr. 47(7):467.
- Mehta, A.M., K.A. Patel and P.J. Dave. 1984. Purification and some properties of an inhibitory peptide isolated from *Lactobacillus acidophilus*, AR,. Dairy Sci. Abstr. 46(6): 431.
- Prescott, S.C. and C.G. Dunn. 1959. Industrial Microbiology 3d ed., Kogakkushi Co., Ltd., Tokyo. 1000pp.
- Reddy, G.V. and K.M. Shahani. 19971. Isolation of an antibiotic from *Lactobacillus bulgaricus*. Dairy Sci. Abstr. 34 (1): 748.
- Rice, S., R.R. Eitenmiller and P.E. Kochler. 1975. Histamine and tyramine content of meat products. J. Milk Food Technol. 38:256-258.
- Rubin, H.E. 1985. Protective effect of casein toward *Salmonella typhimurium* in acid-milk. J. Appl. Bacteriol. 58(3) : 251-255.
- Smith, T.L. and S.A. Palumbo. 1983. Use of starter cultures in meats. J. Food. Prot. 46(1):997-1006.
- Sorrels, K.M. and M.L. Speck. 1970. Inhibition of *Salmonella gallinarum* by culture filtrates of *Leuconostoc citrovorum*. J. Dairy Sci. 53: 239-240.
- Tanaka, N., E. Traisman, M.H. Lee, R.G. Cassens and E.M. Foster. 1980. Inhibition of botulinum toxin formation in bacon by acid development. J. Food. Prot. 443:450-452.
- Tittsler, R.P., C.S. Pederson, E.E. Snell, D. Handlin and C.F. Niven, Jr. 1952. Symposium on the lactic acid bacteria. Bact. Rev. 16:227-260.
-

"ดาวชีวิต"

โลก (Earth) คงจะเป็นดวงดาวสันแสงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ แต่ก็ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะคงอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไร มีผู้กล่าวว่ามนุษย์ (Haman) เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมโลก เป็นตัวทำลายระบบนิเวศวิทยาของโลก มนุษย์มีอันตรายต่อเพื่อนร่วมโลกมากกว่า ภัยธรรมชาติใด มนุษย์บางคนลืมนึกไปว่าโลก 'EARTH' นั้นจะคงเป็น EARTH ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า แม่น้ำ และต้นไม้

E = Environment

A = Animal and air

R = River

T - Tree

H - Human

ถ้ามนุษย์คิดว่าโลกนี้มีแต่H เท่านั้นก็พอแล้วมนุษย์ผู้นั้นคงจะได้ H สมใจ คือ
Heat ชนิต No Heaven