

การวิเคราะห์ห้าปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลสาบสงขลา

THE DETERMINATION OF HEAVY METALS IN THE WATER OF SONGKHLA LAKE

ประดิษฐ์ มีสุข *

สาวณี โพชนุกูล **

* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

** เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 6 ฝ่ายเคมีวิเคราะห์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ เขต 1 จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ห้าปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเก็บตัวอย่าง น้ำทะเลสาบจากจุดที่มีน้ำเสียจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม นำน้ำตัวอย่าง มาวิเคราะห์ห้าปริมาณโลหะหนักด้วย เทคนิควิธี อะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตรโฟโนมิตรีแบบพ่นสารโดยตรง (direct aspiration) สำหรับวิเคราะห์ธาตุทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และแมงกานีส แบบไอเดย์วูฟ (cold vapour) สำหรับวิเคราะห์ปรอท และแบบไบไฮดริดเจเนอเรชัน (hydride generation) สำหรับการวิเคราะห์ธาตุเชลเลนียม

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในน้ำทะเลสาบสงขลา มีทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส ปรอทและเชลเลนียม อยู่ 0.003-0.020, 0-0.10, 0.03-0.06, 0.05-0.51, 0-0.05 และ 0.001-0.027 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) ตามลำดับ

Abstract

The aim of this research was to analyzed the amount of heavy metals in the water of Songkhla lake. Nine samples of water were collected from nine communities and industrial plants. The samples were analyzed for the quantity of heavy metals using atomic absorption spectrophotometry method, ie.direct aspiration technique for determination of copper, lead, zinc and manganese, cold vapour technique for determination of mercury, and hydride generation technique for determination of selenium.

The findings revealed that there were copper, lead, zinc, manganese, mercury and selenium ranging between 0.003-0.020, 0-0.10, 0.03-0.06, 0.05-0.51, 0-0.005 and 0.011-0.027 ppm. respectively.

บทนำ

โลหะหนัก เช่น ปรอท เชลเลนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และแมงกานีส เป็นธาตุที่สะสมในร่างกายและเป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าร่างกายได้รับธาตุดังกล่าวจากสิ่งแวดล้อมสะสมจนถึงขนาดหนึ่ง จะทำให้เกิดโรคพิษโลหะหนัก ดังกล่าวได้

อุบัติภัยทะเลสาบสงขลาเป็นทรัพยากร้ำค้างของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดครศีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทะเลสาบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือทะเลสาบตอนนอก ทะเลสาบตอนใน และทะเลสาบใน มีระบบนิเวศน์ที่ให้ผลผลิตทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด สำหรับเลี้ยง ชีวิตประชากร

ประมาณ 1.5 ล้านคน ที่อาศัยรอบลุ่มทะเลสาบแห่งนี้ ปัญหาของทะเลสาบสังขลาบวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขยายตัวของเมืองหลัก การสร้างท่าเรือน้ำลึกและการขยายตัวของอุตสาหกรรมซึ่งล้วนก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมมากขึ้น จึงเกิดปัญหามลพิษ เนื่องจากมีแหล่งน้ำเสียจากชุมชน และจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่ทะเลสาบมากขึ้น จึงเกิดปัญหามลพิษ เนื่องจากมีแหล่งน้ำเสียจากชุมชน และจากโรงงานได้แก่ คลองเตยและคลองอู่ตะเภา ในบริเวณอำเภอหาดใหญ่ คลองขวาง คลองพวง และคลองลำโรง บริเวณ อำเภอเมืองสังขลา และคลองระโนด ในอำเภอระโนด เป็นต้น จึงควรศึกษาด้านค่าวัสดุเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลสาบสังขลาว่าเกินมาตรฐานคุณภาพ น้ำทะเลสาบหรือไม่ และหาทางแก้ไขต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

การเก็บน้ำตัวอย่าง

เก็บน้ำตัวอย่างประมาณ 750 มล. ใส่ขวดพลาสติกที่สะอาด เติมกรดในตริกเข้มข้น .5 มล.เก็บไว้ในตู้เย็น วันที่และจุดที่เก็บตัวอย่าง แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตาราง 1 แสดงจุดเก็บน้ำตัวอย่าง

วัน เดือน ปี	จุดเก็บน้ำตัวอย่าง
1 มีค. 34	ปากคลองระโนด
1 มีค. 34	บ้านคูชุด
1 มีค. 34	เกาะยอด
1 มีค. 34	ปากคลองพวง
1 มีค. 34	ปากคลองลำโรง
1 มีค. 34	ปากคลองขวาง
1 มีค. 34	ปากทะเลสาบ
5 มีค. 34	ปากคลองลำปา
5 มีค. 34	ปากคลองอู่ตะเภา

วิธีทดลอง

นำน้ำตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 6 ชนิด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ เขต 1 สังขลา ด้วยเทคนิควิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตเมตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) แบบพ่นสารโดยตรง (Direct Aspiration) สำหรับวิเคราะห์ธาตุทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส แบบไออีเย็น (Cold Vapour) สำหรับการวิเคราะห์ปรอท และแบบไฮไดร์เจนอเรชัน (Hydride Generation) สำหรับการวิเคราะห์ธาตุเชลเนียม

ผลการทดลอง

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักทั้ง 6 ชนิด โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตเมตรี แสดงในตาราง 2

ตาราง 2 แสดงช่วงปริมาณโลหะท้องแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส protox และเชเลเนียม ในน้ำทะเลสาบ สงขลา

ธาตุโลหะหนัก	ปริมาณ (ppm)
ทองแดง	0.003-0.02
ตะกั่ว	0-0.10
สังกะสี	0.030-0.06
แมงกานีส	0.050-0.51
protox	0-0.005
เชเลเนียม	0.001-0.027

ตาราง 3 แสดงปริมาณโลหะท้องแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส protox และเชเลเนียม ในน้ำทะเลสาบ สงขลา จำแนกตามจุดเก็บน้ำตัวอย่าง (หน่วย: มิลลิกรัม/ลิตร)

จุดเก็บน้ำตัวอย่าง	ทองแดง	ตะกั่ว	สังกะสี	แมงกานีส	protox	เชเลเนียม
ปากคลองระโนด	0.003	0.01*	0.04	0.51	0.005	0.011
บ้านคูชุด	0.015	0.10	0.04	0.64	0.001	0.012
เกาะยอ (วัดท้ายยอด)	0.017*	0.06	0.05	0.06	0.000	0.012
ปากคลองพะวง	0.008	0.08	0.06	0.06	0.000	0.012
ปากคลองสำโรง	0.018*	0.09	0.05	0.06	0.001	0.027
ปากคลองขาว	0.017	0.09	0.06	0.18	0.000	0.011
ปากทะเลสาบ	0.020	0.07	0.05	0.05	0.004	0.006
ปากคลองลำป้า	0.002	0.00	0.03	0.20	0.001	0.012
ปากคลองอู่ตะเภา	0.017	0.01	0.03	0.20	0.001	0.012

*ปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดคุณภาพน้ำทะเลสาบ

อภิปรายผลและสรุป

เมื่อปี 2532 จัตุรัชัย รัตนไชยและคณะ ได้เสนอตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ว่าควรมีปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่าต่อไปนี้คือ protox 0.001 ppm. ทองแดง 0.005 ppm. ตะกั่ว 0.01 ppm. สังกะสี 1 ppm. แมงกานีส 1 ppm. จากตาราง 3 จะเห็นว่าปริมาณธาตุท้องแดง ตะกั่วและprotox จากแหล่งน้ำตัวอย่างส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลสาบที่เสนอโดยจัตุรัชัย รัตนไชยและคณะ ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

แหล่งของตะกั่วอาจมาจากการแบดเตอร์ หมึกพิมพ์ สี และสารต้านการน้อกของเครื่องยนต์ แหล่งของprotox อาจมาจากการที่ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์

ส่วนปริมาณธาตุสังกะสี แมงกานีส และเชลเนียม ยังไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา แต่ปริมาณแมงกานีสจากภาคล่องระโนดและบ้านคุชุด ที่เริ่มเข้าใกล้ค่าสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ

ควรควบคุมหรือกำจัดโลหะหนักในน้ำทึ้ง ให้ได้มาตรฐานน้ำทึ้งของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง อาจใช้วิธีซึ่นดูดซับโลหะ หรือการตกรตะกอน

ควรวิเคราะห์ท่าปริมาณโลหะหนักตั้งกล่าวในผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบสงขลา ซึ่งใช้เป็นอาหาร ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา และสาหร่าย เพื่อจะได้ทราบปริมาณและหาแนวทางเสนอแนะผู้บริโภคต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ฉัตรไชย วัฒนไชยและคณะ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแผนการจัดการและดำเนินการเพื่อติดตาม
สำรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 2532 หน้า 14

ณรงค์ ไชยสุต, วิธีการวินิจฉัยที่ใช้อุปกรณ์ 2533 หน้า 352, 376-377

Robert, Danby and Stewart, Shaw. GBC H3000.Automatic Hydride Generator

Operation Manual. 1990. pp. 4-6